

Rekonvaleszenz

Anwendungsbereiche:

- Akutes Nierentrauma
- Chronische Niereninsuffizienz
- Hepatische Enzephalopathie

Nicht geeignet für/bei:

- Pankreatitis
- Hyperlipämie
- Wachstum
- Trächtigkeit und Laktation

Produktvorteile:



Diätetisches Management bei Chronischer Nierenerkrankung
Speziell zur Unterstützung der Nierenfunktion bei Chronischer Nierenerkrankung zusammengestellte Rezeptur. Enthält EPA und DHA, einen Antioxidanzienkomplex, hochwertige Proteine, und einen niedrigen Phosphoranteil.



Hohe Energie
Die hohe Energiedichte ermöglicht es, den täglichen Energiebedarf bereits mit einer geringen Nahrungsmenge zu erreichen und so den Verdauungstrakt zu entlasten.



Komplettnahrung
Eine vollwertige und ausgeglichene Flüssignahrung zur Unterstützung der Nierenfunktion bei Hunden mit Niereninsuffizienz, die eine enterale Ernährung benötigen.



Antioxidanzien
Eine synergistisch wirkende Antioxidanzienkombination (Vit. E, Vit. C, Taurin, Lutein) kann helfen, die Körperzellen vor Angriffen aggressiver Stoffwechselprodukte zu schützen.



Sondenfütterung
Die besondere Textur ermöglicht den einfachen Einsatz der Nahrung bei Sondenfütterung (auch bei kleinumigen Sonden) oder peroraler Zufütterung mit der Spritze.



Flüssig: 3 x 200 ml

Durchschnittliche Analyse:

	pro 100 ml
Energie (kcal ME) ¹	150
Protein (%)	5
Fettgehalt (%)	8
NfE (%)	14
Omega 3 (%)	0,63
Omega 6 (%)	2,4
EPA + DHA (%)	0,17
Kalzium (%)	0,16
Phosphor (%)	0,11
Natrium (%)	0,13

¹ nach NRC 2006

RENAL LIQUID enthält einen patentierten Antioxidanzienkomplex aus Vitamin E und C, Taurin und Lutein. Siehe Langanalysentabellen.

Weitere Informationen:

HUNDE MIT KÄFIGRUHE

Es wird empfohlen, den Energiebedarf in der Ruhezeit (Resting Energy Requirements, RER) einzuhalten, der wie folgt berechnet wird:
RER (in kcal/Tag) = 70 × (Körpergewicht in kg)^{0,75}

Die Futtermenge sollte je nach klinischer Entwicklung des Tieres angepasst werden.

Bei Anorexie wird dringend ein Fütterungsplan empfohlen:

- Bei Anorexie < 3 Tagen: Der Bedarf sollte nach 3 Tagen wieder gedeckt werden.
Tag 1: 1/3 des Bedarfs, Tag 2: 2/3 des Bedarfs, Tag 3: gesamter Bedarf
- Bei Anorexie ≥ 3 Tagen: Der Bedarf sollte nach 5 Tagen wieder gedeckt werden.
Tag 1: 1/4 des Bedarfs, Tag 2: 1/2 des Bedarfs, Tag 3: 2/3 des Bedarfs,
Tag 4: 3/4 des Bedarfs, Tag 5: gesamter Bedarf

Es wird empfohlen, die Tagesration in mehrere kleine Mahlzeiten aufzuteilen.

Zusammensetzung:

Milch und Molkeerzeugnisse, Getreide, Öle und Fette, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse. Proteinquelle: laktosearme Milch, Kaseinat. Zusatzstoffe² (pro l): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 6700 IE, Vitamin D3: 220 IE, E1 (Eisen): 40 mg, E2 (Jod): 1 mg, E4 (Kupfer): 4 mg, E5 (Mangan): 3 mg, E6 (Zink): 63 mg, E8 (Selen): 0,2 mg

² In der Deklaration werden die zusätzlich verwendeten Mengen der Zusatzstoffe angegeben, für die Gesamtmenge die Langanalysen des Produkts betrachten.

Empfohlene Tagesration (ml):

Körpergewicht (kg)	Menge (ml)	Körpergewicht (kg)	Menge (ml)	Körpergewicht (kg)	Menge (ml)
2	80	8	220	18	405
3	105	9	240	20	440
4	130	10	260	25	520
5	155	12	300	30	595
6	180	14	335	35	670
7	200	16	370	40	740